

HMG-CoA還元酵素阻害薬（スタチン） 地域フォーミュラリ

推奨	第一推奨	第二推奨	第三推奨
成分名	ロスバスタチン	アトルバスタチン	ピタバスタチン
薬価	2.5mg錠、OD錠：10.1～11.4円 5mg錠、OD錠：10.1～20.6円 10mg錠、OD錠：18円	5mg錠、OD錠：10.1円 10mg錠、OD錠：11～15.8円	1mg錠、OD錠：10.1円 2mg錠、OD錠：13.7～25.4円 4mg錠、OD錠：25.4～79.6円
用法用量	1回2.5～10mg 1日1回 最大20mg/日	1回10mg 1日1回 高脂血症：最大20mg/日 家族性：40mg/日	1回1～2mg 1日1回 最大4mg/日（小児：最大2mg/日）
禁忌	シクロスボリン 急性肝炎、慢性肝炎の急性増悪、肝硬変、 肝がん、黄疸	マヴィレット 急性肝炎、慢性肝炎の急性増悪、肝硬変、 肝がん、黄疸	シクロスボリン 重篤な肝障害 胆道閉塞
特徴など	水溶性ストロングスタチンで、相互作用が 少ない 安価	ストロングスタチン	ストロングスタチン
推奨理由	各種ガイドラインでのストロングスタチン間の推奨レベルに差はない		
	用量調節の幅が大きい 同力価における薬価が他のストロングスタ チンと比較し最も低い	スタンダードスタチンと比較し、LDL-コレ ステロール値低下作用が強い	10歳以上的小児の家族性高コレステロール 血症に適応がある

	力価換算表			
	ロスバスタチン	アトルバスタチン	ピタバスタチン	プラバスタチン
↑ LDL-C 強	20mg			
	10mg	40mg		
	5mg	20mg	4mg	
	2.5mg	10mg	2mg	
		5mg	1mg	20mg
				10mg
				5mg