HMG-CoA還元酵素阻害薬(スタチン)地域フォーミュラリver2

推奨	第一推奨	第二推奨	第三推奨
成分名	ロスバスタチン	アトルバスタチン	ピタバスタチン
薬価	2.5mg錠、OD錠：10.8円(先発:15.1円) 5mg錠、OD錠：10.8～16.9円(先発:23.5円)	5mg錠、OD錠：10.8円(先発:13.6円) 10mg錠、OD錠：10.8～11.5円(先発:16.9円)	1mg錠、OD錠：10.8～13.6円(先発:15.8円) 2mg錠、OD錠：11.6～25.4円(先発:26.5円) 4mg錠、OD錠：21～22.7円(先発:48.7円)
用法用量	1回2.5～10mg　1日1回 最大20mg/日	1回10mg　1日1回 高脂♛症：最大20mg/日 家族性：40mg/日	1回1～2mg　1日1回 最大4mg/日（小児：最大2mg/日）
禁忌	シクロスポリン 急性肝炎、慢性肝炎の急性増悪、肝硬変、肝がん、黄疸	マヴィレット 急性肝炎、慢性肝炎の急性増悪、肝硬変、肝がん、黄疸	シクロスポリン 重篤な肝障害 胆道閉塞
特徴など	水溶性ストロングスタチンで、相互作用が少ない 安価	ストロングスタチン	ストロングスタチン
推奨理由	各種ガイドラインでのストロングスタチン間の推奨レベルに差はない		
	用量調節の幅が大きい 同力価における薬価が他のストロングスタチンと比較し最も低い	スタンダードスタチンと比較し、LDL-コレステロール値低下作用が強い	10歳以上の小児の家族性高コレステロール♛症に適応がある

	力価換算表			
	ロスバスタチン	アトルバスタチン	ピタバスタチン	プラバスタチン
LDL-C　強	20mg			
↑	10mg	40mg		
	5mg	20mg	4mg	
	2.5mg	10mg	2mg	
		5mg	1mg	20mg
				10mg
弱				5mg