経口ヘルペス治 療薬（成人） Ver.2

推奨	第一推奨	オプション	オプション
成分名	バラシクロビル （先発:バルトレックス［参考］）	ファムシクロビル （先発:ファムビル［参考］）	アメナメビル （先発:アメナリーフ［参考］）
薬価	錠５００㎎：64.4～103.3円(先発:112.1円) 顆粒：141.3～164.6円/ｇ	錠２５０ｍｇ：66～72.7円(先発:180.2円) 錠５００ｍｇ「日本臓器」：118.2円	錠２００ｍｇ：1124.3円(先発)
用法用量	[成人]※体重40kg以上の小児 ＜単純疱疹＞ 1回500㎎ 1日2回 ＜造血幹細胞移植における単純ヘルペスウイルス感染症（単純方針）の発症抑制＞ 1回500㎎ 1日2回 造血幹細胞移植施行7日前より施行後35日まで ＜帯状疱疹＞ 1回1000mg 1日3回 ＜水痘＞ 1回1000mg 1日3回 ＜性器ヘルペスの再発抑制＞ 1回500mg 1日1回 なおHIV感染症の患者には1回500mg 1日2回	＜単純疱疹＞ 1回250mg 1日3回 ＜再発性の単純疱疹＞ 1回1000mg 1日2回 ＜帯状疱疹＞ 1回500mg 1日3回	＜帯状疱疹＞ 1回400mg 1日1回 ＜再発性の単純疱疹＞ 1200mgを単回投与
禁忌	本剤の成分あるいはアシクロビルに対して過敏症の既往歴のある患者	本成分に対し過敏症のある患者	・本成分に対し過敏症のある患者 ・リファンピシンを投与中の患者
妊婦・授乳婦[1)]	使用可	妊娠:安全性について十分な評価なし 授乳:情報なし	情報なし
特徴、推奨理由など	標準薬であるアシクロビル製剤と非劣勢が証明されていること、後発医薬品の発売により経済的なメ リットもある 剤形が豊富	耳鼻科領域において、感染細胞内での半減期がアシクロビルより長く、結果ウイルス排泄期間や痛みの消失が早期に期待できるとの意見がある	低感受性株に対する抗ウイルス活性が期待でき、１日1回投与で肝代謝によって消失する 先発品のみ販売であり高額

1）妊娠と授乳　改訂４版より